

PRECOSA®

Saccharomyces boulardii CNCM I-745®



Tänk med magen när du tar antibiotika



**NU
RECEPFRITT
FÖR BARN
& VUXNA!**

Läs mer på www.precosa.se




Precosa innehåller en probiotisk jäststam, *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745, som förebygger diarré och är naturligt tålig mot antibiotika.

Det är en naturligt förekommande jäststam, som upptäcktes 1923 av den franske mikrobiologen Henri Boulard.

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 är nu patenterad och registrerat som läkemedel i över 100 länder.

Dålig i magen av antibiotika?

När man äter antibiotika är det sista man vill ha diarré – också! Eftersom antibiotika även påverkar de nyttiga bakterierna i tarmen är det många som drabbas av obalans i tarmfloran och diarré. Precosa är ett läkemedel som innehåller en unik och helt naturlig probiotisk jäststam som kan förebygga diarré vid antibiotikabehandling.



Magen och dess tarmflora

I magtarmkanalen lever olika mikroorganismer som bildar vår tarmflora. Dessa mikroorganismer är viktiga både för vårt immunförsvar och för tarmens normala funktioner.

Balansen mellan tarmfloras mikroorganismer påverkas av vad vi äter och hur vi mår. Ensidig kost, stress, sjukdom och vissa läkemedel är alla faktorer som kan rubba balansen i tarmfloran och orsaka magbesvär.

Antibiotika påverkar tarmfloran och kan orsaka diarré

Antibiotika används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Men antibiotika påverkar även de goda bakterierna i tarmfloran. Besvär från mage och tarm är vanliga biverkningar av antibiotika och många som behandlas med antibiotika drabbas av diarré eller obalans i magen.



PRECOSA –
ETT PROBIOTISKT
LÄKEMEDEL

FÖREBYGGER
DIARRÉ VID
ANTIBIOTIKA-
BEHANDLING

KAN TAS
SAMTIDIGT MED
ANTIBIOTIKA

Ett probiotiskt läkemedel som är naturligt tåligt mot antibiotika

Precosa innehåller en unik probiotisk jäststam, *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745, som är naturligt tåligt mot antibiotika. Precosa kan därför tas tillsammans med antibiotikakuren utan att förlora sin effekt.

Förebygger diarré på flera olika sätt

Precosa förebygger diarré vid antibiotikabehandling genom att bland annat förhindra tillväxt av vissa tarmbakterier som kan orsaka diarré och skyddar tarmslemhinnan genom att blockera giftiga ämnen (toxiner).

Bra att veta innan du använder Precosa

Precosa finns tillgängligt som

- *Dospåsar* med pulver i tuttfruktsmak - för vuxna och barn från 2 år
- *Kapslar* - för vuxna och barn över 6 år.

I bipacksedeln hittar du information om dosering och eventuella biverkningar. Läs alltid bipacksedeln noga innan användning och kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor eller behöver råd.



Läs mer om Precosa på
www.precosa.se

Tips och råd vid behandling

- Påbörja behandling med Precosa samtidigt som du börjar ta antibiotika eller inom de närmaste 2–3 dagarna (48–72 timmar) efter första dosen av antibiotika.
 - Fortsätt att ta Precosa i minst 3 dagar efter avslutad antibiotikabehandling men inte längre än 4 veckor.
 - Precosa dospåsar med pulver blandas med mat eller dryck.
 - Blanda inte Precosa med iskalla eller varma/heta drycker
 - Förvaras i rumstemperatur och utom syn- och räckhåll för barn.
-

PRECOSA®

Saccharomyces boulardii CNCM I-745®

Läs bipacksedeln noga innan användning.

Läs mer på www.precosa.se eller fråga på ditt apotek.

Precosa (*Saccharomyces boulardii*, stam CNCM I-745) kapsel eller pulver till oral suspension 250 mg. Hos vuxna och barn från 2 års ålder som profylax mot antibiotikaassocierad diarré. Pulvret i dospåsen kan användas till barn från 2 år och kapsel till barn från 6 år. Pulvret i dospåsen ska inte blandas med varma (över 50 °C), iskalla eller alkoholhaltiga drycker eller mat. Behandlingen bör inte pågå i mer än högst 4 veckor. Använd inte om överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, allergi mot jäst, om du har central venkateter eller eller nedsatt immunförsvar. Kontakta läkare vid svår diarré som inte förbättras efter 2-3 dagar, trots behandling med Precosa. Eller vid feber, blodig eller slemmig avföring, samt symtom på uttorkning. Sluta att ta Precosa och kontakta läkaren om du får svullnad i ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andninnsvärigheter. **Läs bipacksedeln före bruk.** Ytterligare information: Biocodex AB, info@biocodex.se. 10/2022

Läs mer på www.precosa.se.

BIOCODEX 